



JASIA



Top-Sorte für trockene & leichte Standorte

STÄRKEKARTOFFEL

SORTENEIGENSCHAFTEN

Reifezeit	spät (IV)
Entwicklung	zögerlich
Stärkegehalt	hoch
Stärkeertrag	hoch
Lagerung	sehr gut, lange Keimruhe

KNOLLENEIGENSCHAFTEN

Knollenform	rundoval
Schalenfarbe	gelb
Fleischfarbe	hellgelb
Knollenanzahl	mittel



RESISTENZEN

Nematoden	Ro 1, 4
Kartoffelkrebs	Pathotyp 1

ANFÄLLIGKEITEN

Y - Virus	sehr gering
Blattrollvirus	sehr gering
Krautfäule	gering
Knollenfäule	gering
Schwarzbeinigkeit	gering
Schorf	mittel
Beschädigungen	sehr gering
Schwarzfleckigkeit	sehr gering

ANBAUHINWEISE

Pflanzgutvorbereitung

Pflanzgut rechtzeitig (ca. 3 Wochen) vor der Pflanzung aufwärmen und in Keimstimmung bringen. Beizung gegen Rhizoctonia empfehlenswert (Direktbeizung auf die Knolle oder Furchenbeizung).

Pflanzzeit

Ab Mitte März. Jasia hat eine lange Vegetationszeit. Böden müssen trocken und locker sein. Ideale Bodentemperatur ab 12° C.

Pflanzdichte

Jasia bei einer Pflanzgutsortierung von 35/55 mit 39.000 Knollen/ha pflanzen.

Düngung

P-, K- und Mg-Düngung nach Bodenuntersuchung. N-Düngung bei früher Pflanzung 120 - 140 kg/ha inkl. Nmin, inkl. organischer Düngung. Bei später Pflanzung (Ende April / Anfang Mai) N-Düngung mit 80 - 100 kg/ha.

Unkrautbekämpfung

Nach üblicher Praxis. Jasia hat keine Empfindlichkeit für Metribuzin.

Krautfäule

Zum Reihenschluss 1. Behandlung mit systemischen Mitteln, danach Spritzabstände nach Warndienst. Zur Abreife oder Sikkation geeignetes Fungizid zur Sporenabtötung. Alternaria-Vorsorge mit Standardmittel ausreichend.

Rodung

Jasia kann ab Anfang Oktober gerodet werden.

Lagerung

Jasia ist unproblematisch in der Lagerung, auch unter einfachsten Bedingungen. Jasia hat eine sehr lange Keimruhe. Jasia kann auch bei kalten Temperaturen (4° C) aufbereitet werden.

Diese Sortenbeschreibung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln Naturprodukte sind, kann allerdings für die gemachten Angaben keine Haftung übernommen werden.

